



بیمارستان رستمانی پارسین

بلوک زایمان


خونریزی سه ماه اول بارداری



آدرس: پارسین - ۴ کیلومتری جاده دریا - بیمارستان رستمانی

تلفن: ۰۷۶۴۴۶۲۴۰۳۲

منبع ویلیامز




شناسنامه بروشور آموزشی	
عنوان	خونریزی سه ماه اول بارداری
تهیه کننده	فاطمه عائدی مقامی
تایید کننده	کمیته آموزش به بیمار
سال تهیه	مهر ۱۴۰۱
ناظر کیفی	سوپروایزر آموزشی منیره اکبرزاد
تایید کننده علمی	دکتر مهسا سادات میری

چگونه می توانم خونریزی را در

اوایل بارداری متوقف کنم؟

- استراحت فراوان
- اجتناب از رابطه جنسی در حالی که خونریزی می کنید.
- در صورت نیاز از داروهای خفیف تسکین دهنده درد استفاده شود.
- استفاده از داروهای پروژسترونی طبق

نظر پزشک



خونریزی سه ماه اول

حدود ۲۰٪ از زنان در ۱۲ هفته اول بارداری

خونریزی دارند.

دلایل احتمالی خونریزی در سه ماهه اول:

۱- خونریزی لانه‌گزینی: ممکن است در

طی شش تا ۱۲ هفته اول بارداری لکه بینی طبیعی باشد زیرا تخمک بارور شده خود را در پوشش رحم قرار می‌دهد.

۲- سقط جنین تهدید شده: علائم سقط

جنین تهدید شده خونریزی و درد خفیف است ممکنه خونریزی متوقف و بارداری ادامه یابد یا ممکنه خونریزی ادامه پیدا کند که احتمال سقط را بالا می‌برد.

۳- بارداری مولار: در آن بافت غیر طبیعی به

جای جنین داخل رحم رشد می‌کند و علائم دیگر آن تهوع و استفراغ شدید و بزرگ شدن سریع رحم

۴- حاملگی خارج رحمی: در بارداری خارج

رحمی، جنین لقاح یافته در خارج از رحم، معمولاً در لوله رحمی کاشته میشود. در صورت ادامه رشد جنین، می‌تواند باعث پاره شدن لوله رحمی شود.

۵- خونریزی زیر جفتی: در این شرایط خون

بین کیسه حاملگی و دیواره رحم جمع می‌شود. در مواقعی، در معاینه سونوگرافی لخته داخل رحمی دیده می‌شود. بدن مرتباً این لخته‌های خون را دوباره جذب می‌کند. با این حال گاهی اوقات ممکن است خون قدیمی تیره یا حتی لخته‌های کوچک از واژن وجود داشته باشد.



۶- عفونت: هرگونه عفونت دهانه رحم، واژن یا

عفونت مقاربتی (مانند کلامیدیا، سوزاک یا تبخال) می‌تواند در سه ماه اول خونریزی ایجاد کند.



۷- تغییرات دهانه رحم: در دوران بارداری

خون اضافی به دهانه رحم جریان پیدا می‌یابد. مقاربت یا آزمایش پاپ اسمیر که باعث تماس با دهانه رحم می‌شود، می‌تواند باعث خونریزی نیز شود. این نوع خونریزی جای نگرانی ندارد.