



بیمارستان رستماني پارسيان

بلوک زایمان

خونریزی سه ماه دوم وسوم بارداری



آدرس: پارسیان- ۴ کیلومتری جاده دریا- بیمارستان رستماني

تلفن: ۰۷۶۴۴۶۲۴۰۲۲

منبع ویلیامز

چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟

یافتن علت خونریزی در بارداری و درمان خونریزی در بارداری وظیفه پزشک است. پزشک با معاینه دهانه رحم میزان بازبودن آن و احتمال سقط جنین یا زایمان زودرس را بررسی میکند. در صورتی که همراه با خونریزی درد ناحیه شکم یا دیدن لخته خون در بارداری صورت بگیرد حتماً به پزشک مراجعه شود.

شناسنامه بروشور آموزشی	
عنوان	خونریزی سه ماه دوم وسوم بارداری
تهیه کننده	فاطمه عاندي مقامی
تایید کننده	کمیته آموزش به بیمار
سال تهیه	آبان ۱۴۰۱
ناظر کیفی	سو پروایزر آموزشی منیره اکبرزاد
تایید کننده علمی	دکتر مهسا سادات میری

خونریزی در نزدیک زایمان


چند روز پیش از زایمان، توپ موکوسی که دهانه رحم را می پوشاند از طریق واژن دفع می شود و در این حالت معمولاً کمی خون نیز دفع شده و شاهد خونریزی خواهیم بود. البته اگر این خونریزی و علائم زایمان قبل از هفته ۳۷ام بارداری شروع شود، لازم فوراً به پزشک مراجعه کنید ممکن است دچار زایمان زودرس شوید.



© MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH. ALL RIGHTS RESERVED.

خونریزی سه ماه دوم وسوم

احتمال بروز لکه بینی وخونریزی در بارداری در سه ماهه ی دوم وسوم بارداری کمتر می شود.با این حال اگه خونریزی در بارداری ماه چهارم به بعد اتفاق بیفتد،عوارض وآسیب های آن بیشتر است.موارد زیر علت های خونریزی در سه ماهه دوم وسوم بارداری است:



جفت سرراهی :

۱-جفت از طریق بندناف به جفت متصل می شود و از بدن مادر غذا دریافت می کند.محل قرار گرفتن جفت در نیمه بالایی رحم است. اگر شرایطی پیش بیاید وجفت در نیمه پایینی رحم قرار بگیرد ودهانه رحم را مسدود کند ومانع از خروج جنین شود به این حالت جفت سرراهی گفته می شود.معمولا عارضه ای برای جنین ومادر ایجاد نمیکند مگر اینکه دچار اختلال شود وجنین نتواند تغذیه کند.جفت سرراهی با علامت خونریزی بدون درد وبا گشاد شدن دهانه رحم شناخته می شود.

۲- جدا شدن زودرس جفت

جدا شدن جفت باید هنگام زایمان صورت بگیرد. اگر جفت قبل از زایمان جدا شود به این عارضه جدا شدن زودرس جفت یا دکولمان گفته می شود.وشایع ترین علت خونریزی در سه ماه دوم وسوم بارداری است.این عارضه ممکن است موجب مرگ مادر وجنین شود.علائم دیگر جداشدن زودرس جفت به جز خونریزی شامل موارد زیر است:

۱-افزایش ضربان قلب

۲-افزایش شدت وانقباضات رحمی

۳- زایمان زودرس

زایمان قبل از ۳۷ هفتگی بدون یا با پاره شدن کیسه آب را زایمان زودرس می گویند.مهم ترین علامت در بروز زایمان زودرس خونریزی است.علائم زیر از وقوع زایمان زودرس خبر می دهد:

۱- بیش تر از ۵ انقباض رحمی در ساعت اتفاق بیفتد.

۲- فشار شدید در لگن

۳- تورم صورت و دست ها

۴- ترشح روشن وآبکی وخون روشن در واژن

۵-درد همراه باادرار

۶-درد پشت ودرد معده ی طولانی

۷-استفراغ

۸-فشار شدید لگنی

عروق سرراهی

عروق خون رسانده ی به جنین بدون حفاظت بندناف درون لایه پوشاننده رحم قرار دارد و از کانال ورودی رحم عبور می کند. اگرچه امکان پارگی این عروق بسیار کم است.اما در مواقعی که عروق پاره می شود،خونرسانی به جنین کم می شود.نشانه های پاره شدن عروق محیطی ضربان غیر طبیعی قلب جنین و خونریزی شدید است.

