



## بیمارستان رستمانی پارسین

موضوع:

### انواع سقط جنین



• **سقط جنین القایی** اگر به طور قانونی و امن صورت بگیرد، یکی از ایمن‌ترین اقدامات پزشکی تلقی می‌شود. سقط جنین غیر ایمن که توسط افراد غیر ماهر و شرایط غیربهداشتی انجام می‌شود، یکی از دلایل اصلی مرگ و میر مادران است. از آنجایی که سقط غیرقانونی معمولاً در محیط استریل و زیر نظر پزشک انجام نمی‌شود، احتمال ابتلا به عفونت لگنی پس از آن افزایش می‌یابد. مصرف برخی از قرص‌های سقط جنین می‌تواند برای سلامت مادر بسیار خطرناک باشد، پس باید تحت نظر پزشک مصرف بشوند.

شناسنامه پمفلت آموزشی کد	
عنوان	انواع سقط جنین
تهیه کننده	فاطمه محمدی
تایید کننده	سوپروایزر آموزشی خانم منیره اکبرزاد
سال تهیه	آبان ۱۴۰۳
ناظر کیفی	دکتر مرضیه محمودی متخصص زنان و زایمان

منابع: ویلیامز

## سقط مکرر:

تعداد کمی از زنان، این نوع سقط را تجربه می‌کنند. اگر سه مورد یا بیشتر سقط متوالی داشته اید، به این نوع سقط، سقط مکرر می‌گویند.

## سقط عمدی یا القایی:

زمانی که به تشخیص پزشک با استفاده از دارو یا عمل جراحی، بارداری پایان یابد، سقط عمدی یا القایی اتفاق می‌افتد.



## سقط جنین:

سقط جنین، از دست دادن جنین قبل از هفته بیستم بارداری است. از دست دادن جنین بعد از هفته ۲۰ بارداری مرده زایی نامیده می شود

### علائم سقط جنین

- انقباضات شکمی شبیه درد پریود
- خونریزی واژینال

### انواع سقط

- ۱) خودبه خودی
- ۲) عمدی



## انواع سقط خودبه خودی

**تهدید به سقط جنین:** خونریزی خفیف واژینال یا دردی در قسمت تحتانی شکم را حس کنید. ممکن است روزها یا هفته‌ها طول بکشد و دهانه رحم همچنان بسته بماند. به ندرت می‌توان جلوی این نوع سقط را گرفت درد و خونریزی ناشی از این نوع سقط ممکن است برطرف شود و بارداری را به طور سالم سپری کرده و نوزاد هم کاملاً سالم متولد شود و نیز ممکن است اوضاع بدتر شود و به سقط جنین بینجامد

**سقط جنین اجتناب ناپذیر:** در این شرایط معمولاً خونریزی واژینال بسیار بیشتر شده و گرفتگی‌های شکمی قوی در ناحیه تحتانی شکم به وجود خواهد آمد. در طول سقط جنین دهانه رحم باز شده و جنین در حال رشد، همراه خونریزی خارج می‌شود.

### سقط جنین کامل:

زمانی که تمام بافت بارداری از رحم خارج شده باشد، سقط جنین کامل اتفاق افتاده است. ممکن است خونریزی واژینال برای چند روز ادامه یابد. در این شرایط، علائمی همچون انقباضات شکمی شبیه درد زایمان یا پریود شدید بوجود می‌آیند

## سقط جنین ناقص:

گاهی اوقات پس از سقط مقداری از بافت حاملگی در رحم باقی می‌ماند که در این صورت خونریزی واژینال و انقباضات زیر شکم ادامه می‌یابد. در چنین شرایطی پزشک ضرورت انجام کورتاژ را تشخیص خواهد داد.

**سقط فراموش شده:** گاهی اوقات، جنین مرده است، اما در رحم باقی مانده است. ممکن است ترشحات قهوه‌ای رنگی را از واژن ببینید. ممکن است برخی از علائم بارداری مانند حالت تهوع و خستگی با بروز این مشکل برطرف شوند.

