



مصرف داروهای تزریقی :

داروهای تزریقی معمولاً به صورت‌های عضلانی - وریدی زیر جلدی ، داخل نخاعی و داخل جلدی انجام می‌شود که این پروسیجرها حتماً باید توسط افراد مجرب انجام شوند محدود نمودن مناسب کودک مناسب کودک سبب کاهش میزان در ۲ میزان ایمنی میشود.



نحوه یا استفاده از قطرات بینی گوش و چشم قطره چکان های مصرفی باید دارای نوک گرد و صاف باشند.



موقع مصرف داروی خوراکی نوزاد یا شیرخوار را در بغل بگیرید و داروی مایع را از قسمت پهلوی زبان بطور آرام سازیر نمایید و از خفگی نوزاد به این طریق جلوگیری نمایید.
دادن دارو از را متعدد:

برخی داروها مانند مسکنها ، تب برها و ضد استفراغها بشکل شیافت می باشند پس از باز کردن کاغذ روی شیافت آنرا با آب گرم خیس کنید استفاده از روش های مختلف بجای آب گرم سبب اختلاف در جذب مواد دارویی شیافت می شود. کودک را روی شکم یا پهلوی چپ قرار داده و با دستکش نوک شیافت را وراد مقعد نموده به طرف خود هدایت کنید بدلیل دفع احتمالی دو طرف باسن را به مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه به یکدیگر نزدیک نمایید.

نحوه دادن دارو:



نحوه دادن دارو از راه دهان معمولاً داروها جهت مصرف برای کودکان و شیرخواران بصورت مایع و معطر تولید می شوند.



قرص ها را می توان به صورت پودر در آورده و با آب مخلوط کرد. هرگز دارو را با شیر یا غذا مخلوط ننمایید چون باعث تنفر کودک از غذا می شود داروهای خوراکی را می توان با وسایل مختلف اندازه گیری و مصرف نمود این وسایل شامل موارد زیر است:
فنجان دارویی ، قاشق چایخوری ۵ میل لیتری ، قطره چکان و سرنگ پلاستیکی.



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان

نحوه دادن دارو



شناسنامه بروشور آموزشی	
نحوه دادن دارو	عنوان
مهین روزچک	تهیه کننده
کارشناس پرستاری	سمت
کمیته آموزش به بیمار	تایید کننده
1402	سال تهیه
دکتر خالد رحمانیا	ناظر کیفی

منابع :

نلسون ۲۰۱۲ - مارلو ۲۰۱

استنشاقی:

برخی از داروها برای بیماران تنفسی تجویز می شوند که بایستی از طریق استنشاقی به کودکان داده شود در این روش دارو به صورت گاز در کیپسول های فلزی تولید می شود و در موقع استفاده به صورت اسپری و پاف داده میشود.



استفاده از قطره بینی:

شیرخوار را به پشت قرار داده و سر او را قدری به پهلو برگردانید با دست دیگر قطره بینی را دقیقاً در مجرای بینی بچکانید و سپس سر کودک را ۳ الی ۵ دقیقه پایین تر از شانه ها نگه دارید از تمیز بودن مجرای بینی قبل از ریختن قطره مطمئن باشید.
استفاده از قطره چشم:

شیرخوار را در وضعیت طاق باز قرار دهید نوک قطره چکان را اندکی بالاتر از بن بست تحتانی حلقه قرار داده و دارو را خالی کنید دارو را هرگز مستقیماً روی روی قرنیه نچکانید.



استفاده از قطره گوش:

به ملایمت گوش را به پایین و عقب بکشید و محلول را داخل گوش بچکانید قطره چکان را هرگز به درون مجرای گوش فرد فرو نکنید سپس ۵ الی ۱۰ دقیقه صبر کنید.